



SE SOUVENIR DE POSER DES QUESTIONS CONCERNANT SON PLAN D'ACCOUCHEMENT INDIVIDUEL

- Votre cliente sait-elle quand son bébé doit naître ?
- A t-elle identifié un prestataire compétent pour assister à l'accouchement ?
- A t-elle identifié une structure sanitaire pour l'accouchement/en cas d'urgence ?
- Connaît-elle les signes de danger lors de la grossesse et de l'accouchement ?
- A t-elle choisi quelqu'un pour prendre les décisions en cas d'urgence ?
- Sait-elle où se procurer de l'argent en cas d'urgence ?
- A t-elle un plan pour le transport en cas d'urgence ?
- A t-elle rassemblé les fournitures de base pour l'accouchement ?
- A t-elle un partenaire pour lui prêter assistance lors de l'accouchement ?

Oui !



Avant que la cliente ne quitte votre clinique, ARRETEZ-VOUS et demandez-lui si :

- Elle connaît les signes de danger lors de la grossesse et de l'accouchement
- Elle a un approvisionnement en comprimés de fer/folate
- Elle a pris sa SP et a reçu son injection antitétanique
- Elle connaît l'heure et la date de sa prochaine consultation prénatale et la dose de SP
- Elle a un plan pour l'accouchement
- Elle a une méthode de planification familiale postnatale en vue



Maintenant vous avez préparé votre cliente !

SOINS PRENATALS FOCALISES

B- Bienvenue :	Saluer la femme
E- Entretien :	Lui demander si elle a préparé un plan individuel pour l'accouchement
R- Renseigner :	Lui parler des signes de danger
C- Choix :	L'aider à choisir un plan personnel pour l'accouchement
E- Expliquer :	Ce qu'est le paludisme ; le traitement préventif intermittent (TPI) à la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)
R- Rappel :	Des signes de danger, du plan d'accouchement individuel et des prochaines consultations prénatales (16 ^è semaine; 24–28 semaines; 32 ^è semaine; 36 ^è semaine)

PREMIERE VISITE

- Donner des conseils sur le plan d'accouchement individuel
- Prendre les antécédents
- Effectuer un examen physique
- Voir s'il y a présence d'anémie
- Dépister la syphilis
- Donner une vaccination antitétanique, du fer et du folate
- Donner de la SP si à plus de 16 semaines
- Lui parler des signes de dangers
- La conseiller et l'éduquer

DEUXIEME VISITE

- Vérifier le plan individuel pour l'accouchement
- Donner de la SP, du fer et du folate
- Ecouter les bruits du cœur fœtal
- Conseiller et éduquer

TROISIEME VISITE

- Vérifier le plan d'accouchement individuel
- Donner de la SP, du fer et du folate
- Administrer le vaccin antitétanique (si 4 semaines se sont écoulées depuis la première dose)
- Ecouter les bruits du cœur fœtal
- Conseiller et éduquer

QUATRIEME VISITE

- Revoir le plan d'accouchement individuel
- Voir s'il y a présence d'anémie
- Vérifier la présentation fœtale
- Donner de la SP (si elle n'a pas encore eu trois doses) et du fer et du folate
- Conseiller et éduquer

